宗谷暖流の短周期変動

江淵 直人・深町 康・大島 慶一郎 (北大・低温研)

Introduction

Ebuchi, Fukamachi, Ohshima, and Wakatsuchi (JO, 2009)

短波海洋レーダ，海底設置ADCP，沿岸潮位などのデータを用いて宗谷暖流の季節変動および短周期(5~20日周期)変動について宗谷暖流の短周期変動のメカニズムについて調べた.

今回はその続報として，宗谷海峡域および紋別沖の2ヶ所の海洋レーダおよび海底設置ADCPのデータから，宗谷暖流の短周期変動の伝搬の様子を調べた. 途中経過を報告する.

宗谷暖流のモニタリング

- HF レーダ
- 沿岸潮位計
- 海底設置型ADCP
- Jason-1衛星高度計

北大低温研 短波海洋レーダシステム

ノシャップ岬, 宗谷大岬, 猿払, 雄武, 紋別の5局

海洋レーダによる表層流の観測例

2003年
8月17日20時

時間間隔: 1時間
空間分解能: 3 km

毎時のリアルタイムデータを公開中

<http://wwwoc.lowtem.hokudai.ac.jp/hf-radar/index.html>

月平均表層流速場の例

2003年8月

毎時観測値

25時間移動平均

日平均値

旬・月平均値

浜鬼志別沖ラインを横切る南東流のプロファイル

宗谷暖流の表面流量の変動と 稚内一網走の水位差

相関係数 = 0.774

宗谷暖流の表面流量の変動と 稚内一網走の水位差(拡大図)

短周期流速変動の鉛直構造 (ADCP)

水深
↓

分散保存型スペクトル

水位差とHFレーダ表面流量および ADCP 表層流速とのクロススペクトル

HF radar

ADCP

風による陸棚波の効果

の風
 び册
 場る

稚内一網走水位差とERA40風速・風向とのラグ相関 (1967-2002)

水位差と最も相関の高い風向成分を方位角 10° 単位で探す。
矢印の向きはその風向，矢印の長さと同ターは相関係数を表す。

ERA40の南北風成分と稚内ー網走水位差の クロススペクトル

ECMWF客観解析データ南北風成分と HFレーダ表面流量および ADCP表層流速とのクロススペクトル

Ebuchi et al. (2009) のまとめ

- 宗谷暖流の短周期変動（5～15日）のメカニズムを潮位，HFレーダ，海底設置 ADCPの観測データと ECMWF 海上風データを用いて調べた。
- 海峡付近の風の場合によって励起された陸棚波による水位変動を考えると観測された短周期変動と比較的よく一致する結果が得られた。
- 宗谷海峡域と雄武一紋別沖域の2箇所のレーダのデータ，浜頓別沖および宗谷岬沖の2箇所の海底設置ADCPのデータで短周期変動の伝搬の様子を捉えることを試みた

データ

- 沿岸潮位(稚内, 紋別, 網走)
毎時データ, 気圧補正, 2003年8月～2009年6月
- 海洋レーダ(毎時データ)
 - 宗谷海峡域 2003年8月～2009年6月
 - 雄武一紋別沖域 2004年1月～2005年12月
2006年7月～2007年1月
2008年6月～2009年6月
- ADCPデータ
 - 浜頓別沖 2004年5月～2005年5月
 - 宗谷岬沖 2006年9月～2008年7月

データ解析

潮位データ(気圧補正済), 海洋レーダ流速データ,
ADCP流速データ

24時間タイド・キラー・フィルター

3.7-44日バンドパス・フィルター

稚内-網走潮位差を起点としたラグ相関解析
相関係数が最大となる時間差を決定

水位差, Box-N での南東流速, 沿岸水温 の時系列の例

水位差, Box-N および Box-S での南東流速の時系列の例

宗谷海峡域での位相伝搬

海峡からの距離と位相差

(岸から 10~50 km のデータのみを使用)

流速偏差のコンポジット (浜鬼志別沖ライン)

短周期変動の流速偏差のピークは、流速プロファイルのピークより
10 km ほど沖側に存在する

海峡からの距離と位相差

想定されるメカニズム

- 陸棚波の高次モード(竹山, 2002)
- 平均流もしくは平均流のシアが関与するメカニズム(フロント波など)

バンドパス・フィルター後の流速偏差, 水位差の変動強度の季節変化

平均流や平均流シアの強い夏は逆に
短周期の流速変動は小さい

オホーツク沿岸の陸棚波の高次モード (竹山, 2002)

湧別沖

湧別沖

枝幸沖

水位 流速

図 5.8: h1 の海底地形と第 1~3 モードの岸に沿う成分 (破線), 沖に向かう成分 (点線), 水位 (実線) の分布。流速, 水位はそれぞれ最大が 1 となる様に規格化している。

図 5.9: h2 の海底地形と第 1~3 モードの岸に沿う成分 (破線), 沖に向かう成分 (点線), 水位 (実線) の分布。流速, 水位はそれぞれ最大が 1 となる様に規格化している。

枝幸沖

周期10日に対応する3次モードの位相速度は 74 km/day (湧別沖), 93 km/day (枝幸沖)

まとめ

- 沿岸潮位, 海洋レーダ(2ヶ所), ADCP(2ヶ所)のデータから, 宗谷暖流の短周期変動成分の伝搬の様子を調べた.
- 宗谷海峡域から下流側へ約 100 km/day で伝搬する流速偏差が捉えられた.
- そのメカニズムはまだよく分からない.
- 位相速度だけなら陸棚波の3次モードに非常に近い.
- 流速プロファイルは, 形は合うが, ピークの位置に違いがある(調整途上?).
- 季節変動を考えると平均流やそのシアによるメカニズムは考えにくい.

Back-up Slides

Wind-induced Continental Shelf Waves

(Takeyama, 2002)

紋別一網走の水位のクロススペクトル (1967-2002)

5－15日の周期帯の平均:

$\text{coh}^2 = 0.758$, 位相差 = 0.166 days (~ 4 hr)

紋別一網走間: 82 km (直線距離)

位相速度: ~ 490 km/day ~ 6 m/s

短周期変動の季節性

バンドパスフィルター(5~45日)後の時系列の RMS を
月ごとに平均 (1967~2002)

稚内

紋別

網走

稚内一網走